

Braden QD 儿童压力性损伤风险评估量表

压力强度与时间				得分
<p><b>移动度</b> 自主改变和控制体位的能力</p>	<p>0. 无受限 能自主频繁大幅度地改变体位或移动肢体。</p>	<p>1. 受限 偶尔小幅度地改变体位或移动肢体, <b>或</b>不能自主改变体位(包括婴儿因年龄过小而无法翻身)。</p>	<p>2. 完全受限 不能自主进行任何细微的体位改变或移动肢体。</p>	
<p><b>感知觉</b> 能够以与年龄相称的方式对压力相关的不适做出有意义的反应</p>	<p>0. 无缺失 有反应, 无感觉缺失, 能感知或表达不适。</p>	<p>1. 受限 不能自如地表达压力相关的不适<b>或</b>存在一定的感官缺失限制了患儿感受压力相关不适的能力。</p>	<p>2. 完全受限 因意识水平降低、应用镇静剂而无反应<b>或</b>感觉缺失限制了感受体表大范围压力相关不适的能力。</p>	
<b>皮肤和组织对压力的耐受性</b>				
<p><b>摩擦与剪切</b> 摩擦力: 皮肤与支撑面相对位移时发生 剪切力: 皮肤和相邻的骨突表面相对位移时发生</p>	<p>0. 没有问题 在移动时有足够的力量完全抬举自己的身体。卧床或坐椅时可维持良好的体位。改变体位时能够完全抬举身体</p>	<p>1. 潜在问题 身体移动时<b>稍</b>需要协助。卧床或坐椅时偶尔下滑, 需要重新摆正体位。在重新摆正体位的过程中, 皮肤经常与支撑面摩擦。</p>	<p>2. 有问题 身体移动时<b>完全</b>要靠协助, 卧床或坐椅时经常下滑, 需要频繁辅助摆正体位。无法做到无摩擦的抬举身体<b>或</b>存在强直、挛缩、瘙痒或躁动等问题导致持续的摩擦。</p>	
<p><b>营养</b> 符合年龄的饮食-评估最近3天的饮食</p>	<p>0. 足够 热量<b>和</b>蛋白质摄入<b>充足</b>能满足相应年龄所需的代谢和生长需要。</p>	<p>1. 不良 热量摄入<b>不足或</b>蛋白质摄入<b>不足</b>, 不能满足相应年龄所需的代谢和生长需要,<b>或</b>在一天中任何时间接受营养补充剂。</p>	<p>2. 贫乏 热量<b>和</b>蛋白质摄入<b>不足</b>, 不能满足相应年龄所需的代谢和生长需要。</p>	

组织灌注与氧合	0. 正常 患儿血压在相应年龄段的正常范围内, <b>且</b> 氧饱和度≥95%, <b>且</b> 血红蛋白正常, <b>且</b> 毛细血管再充盈时间≤2s	1. 潜在问题 患儿血压在相应年龄段的正常范围内而氧饱和度<95%, <b>或</b> 血红蛋白<10g/dl, <b>或</b> 毛细血管再充盈时间>2s。	2. 受损 低血压 <b>或</b> 体位改变会伴随血流动力学不稳定	
医疗器械				
医疗器械的数量	每件医疗器械*计 1 分, 最多 8 件 (最高计 8 分) *目前附着或穿过患儿皮肤或粘膜的任何诊断或治疗器械。			
器械重置/皮肤保护	0. 无医疗器械	1. 潜在问题 所有医疗器械能被重置 <b>或</b> 器械下方皮肤均被保护。	2. 有问题 任何一件或多件医疗器械不能被重置 <b>或</b> 器械下方皮肤没有被保护。	
			总分 (≥13 分认为存在风险)	