

Intensità e durata della pressione				Score
Mobilità La capacità di cambiare e controllare autonomamente la posizione corporea	0 Nessuna limitazione Compie in autonomia e frequentemente cambiamenti sostanziali della posizione corporea o delle estremità	1 Limitata Compie minimi e poco frequenti cambiamenti della posizione corporea o delle estremità OPPURE non è in grado di riposizionarsi autonomamente (compresi bambini troppo piccoli per pronarsi/supinarsi)	2 Completamente immobile Non compie in autonomia alcun cambiamento, neanche minimo, della posizione corporea o delle estremità.	
Percezione sensoriale La capacità di rispondere in modo apprezzabile, compatibilmente con lo stadio di sviluppo, al disagio legato alla pressione	0 Nessuna compromissione. È in grado di rispondere E non ha deficit sensoriali che limitino la capacità di percepire o comunicare il disagio	1 Limitata Non è sempre in grado di comunicare il disagio legato alla pressione OPPURE ha qualche deficit sensoriale che limita l'abilità di percepire il disagio	2 Completamente limitata Nessuna risposta, a causa del ridotto livello di coscienza o della sedazione OPPURE deficit sensoriali che limitano la capacità di percepire il disagio legato alla pressione sulla maggior parte della superficie corporea	
Tolleranza della cute e strutture di supporto				
Frizione e sfregamento Frizione: avviene quando la cute si muove sulle superfici di supporto Sfregamento: avviene quando la cute e le prominenze ossee adiacenti sfregano uno sull'altro.	0 Nessun problema È sufficientemente forte da sollevarsi durante un movimento. Mantiene una corretta posizione del corpo in culla/lettino in ogni momento. In grado di sollevarsi completamente durante un cambio di posizione.	1 Problema potenziale Necessita di assistenza parziale durante il movimento. Occasionalmente scivola in giù nella culla/lettino, necessitando di riposizionamento. Durante il riposizionamento spesso la pelle sfrega sulla superficie.	2 Problema in atto Necessita di assistenza completa nel movimento. Scivola spesso in giù con bisogno di riposizionamento. E' impossibile un completo sollevamento senza che la pelle sfregi sulla superficie OPPURE spasticità, contratture, formicolio o agitazione conducono ad una costante frizione.	
Nutrizione Dieta adeguata all'età – Accertamento basato sui tre giorni consecutivi più recenti.	0 Adeguata Adeguato apporto proteico e calorico per età tramite la dieta, per supportare metabolismo e crescita	1 Limitata Inadeguato apporto calorico OPPURE Inadeguato apporto proteico per supportare metabolismo e crescita OPPURE riceve nutrizione supplementare (in qualsiasi momento della giornata)	2 Carente Apporto calorico e proteico insufficiente inadeguato per l'età e per supportare metabolismo e crescita	
Perfusione tissutale e ossigenazione	0 Adeguata Normoteso per l'età E saturazione a target E emoglobina normale E refill capillare ≤2 secondi	1 Problema potenziale Normoteso per l'età, CON saturazione sotto target OPPURE emoglobina sotto target OPPURE refill capillare >2 secondi	2 Compromessa Ipoteso per l'età OPPURE emodinamicamente instabile ai cambi posturali	
Device				
Numero di presidi	Assegnare 1 punto per ogni dispositivo*, fino a 8 (punteggio massimo 8 punti)			
Riposizionamento/ dispositivi di protezione	0 Nessun device	1 Problema potenziale Tutti i device possono essere riposizionati OPPURE la cute sotto ogni device è protetta	2 Problema in atto Uno o più device non possono essere riposizionati OPPURE la cute non è protetta sotto tutti i device	
TOTALE				

*Qualunque dispositivo diagnostico o terapeutico collegato al paziente o che attraversi la sua cute o le mucose.

