Afvænningsvurderingsværktøj Version 1 (WAT-1) og scoringsinstruktioner

Data fra patientjournal		**Score for punkt**
Nogen løse/vandige afføringer	Nej=0 ; Ja=1	
Nogen opkastning, kløgning, svælgrefleks	Nej=0 Ja=1	
Temperatur > 37,8 °C	Nej=0 ; Ja=1	
Observation 2 minutter inden stimulus		
Tilstand	Sovende/vågen rolig=0 Vågen bedrøvet=1	
Rysten	Ingen/mild=0 Moderat/svær=1	
Nogen svedning	Nej=0 ; Ja=1	
Ukoordinerede/gentagne bevægelser	Ingen/mild=0 Moderat/svær=1	
Gaben eller nysen	Ingen eller 1=0 ≥ 2=1	
1 minut stimulus observation		
Farer sammen ved berøring	Ingen/mild=0 Moderat/svær=1	
Muskel spænding	Normal=0 ; Øget=1	
Restituering efter stimulus		
Tid til at blive rolig	< 2 minutter=0 2 – 5 minutter=1 > 5 minutter=2	
Samlet score (0-12)		

E-code: _____

Dato for vurdering: _____

Tidspunkt for vurdering: _____

Initialer for den person der administrerer vurderingen:_____

Scoringsinstruktioner

Indhent information fra patientjournal. Dette kan gøres før eller efter observation.
Nogen løs eller vandig afføring dokumenteret i de sidste 12 timer scores som et 1.
Score 0 hvis ingen bemærket.
Score 1 hvis opkastning, spontan kløgning eller svælgrefleks blev dokumenteret i de sidste 12 timer; score 0 hvis ingen blev bemærket.
Score 1 hvis den hyppigst dokumenterede temperatur var på mere end 37,8 °C i de sidste 12 timer; score 0 hvis dette ikke var tilfældet.

Observation 2 minutter inden stimulus:
Tilstand: Score 1 hvis observeret som vågen og bedrøvet i de 2 minutter forud for stimulus; score 0 hvis sovende, eller vågen og rolig/samarbejdsvillig.
Rysten: Score 1 hvis moderat til svær rysten observeret i de 2 minutter forud for stimulus; score 0 hvis ingen rysten (eller kun mindre, intermitterende rysten).
Svedning: Score 1 hvis svedning observeret i de 2 minutter forud for stimulus; score 0 hvis ingen svedafsondring bemærket.
Ukoordinerede/gentagne bevægelser: Score 1 hvis moderat til svært ukoordinerede eller gentagne bevægelser, såsom drejning af hovedet fægtning med ben eller arme, eller spænding af ryggen som en flitsbue blev observeret i løbet af de 2 minutter inden stimulus; score 0 hvis ingen (eller kun milde) ukoordinerede eller gentagne bevægelser.
Gaben eller nysen: Score 1 hvis mere end 1 gab eller nys observeret i løbet af de 2 minutter forud for stimulus; score 0 hvis 0 til 1 gab eller nys.
1 minut stimulus observation
Farer sammen ved berøring: Score 1 hvis moderat til svær startle-refleks forekommer ved berøring under stimulus; score 0 hvis ingen (eller mild).
Muskel spænding: Score 1 hvis spænding øges under stimulus; score 0 hvis normal.

Restituering efter stimulus
Tid til at blive rolig: Score 2 hvis det varer mere end 5 minutter efter stimulus; score 1 hvis opnået inden for 2 til 5 minutter; score 0 hvis opnået på mindre end 2 minutter.

Læg de 11 tal sammen for at få den samlede WAT-1 score.

© 2007 Linda S. Franck and Martha A.Q. Curley
Translated by: Astra Zeneca, June 20, 2010
Made available under a Creative Commons Attribution-No Derivatives License (CC BY-ND 2.0)
Full terms of license available here: https://creativecommons.org/licenses/by-nd/2.0/